

Şüpheli İnfluenza Vakalarının Başvurması Durumunda

- Hastalar birinci basamak dâhil tüm sağlık kuruluşlarında takip ve tedavi edilebilir.
- Hastalar influenza vaka [algoritmasına](#) göre yönetilmelidir.
- Yatış gerektiren hastalar ikinci ve üçüncü basamak tüm hastanelerde takip edilebilirler, hastaların negatif basınçlı odada yatırılmasına gerek yoktur.
- Hastaların yoğun bakım tedavisi ihtiyacı olması durumunda mevcut hastanede yoğun bakım ünitesi yok ise en yakın hastaneye sevki yapılarak takip edilmelidir.
- Hastalar mümkün ise tek kişilik odalarda yatırılmalıdır. Bu mümkün değil ise influenza düşünülen hastalar aynı odada yatak araları en az 1'er metre olacak şekilde yatırılmalıdır
- Karantina uygulamasına gerek yoktur. Bu nedenle acil servis, yataklı servis ya da diğer birimlerin influenza nedeniyle kapatılmasına gerek yoktur.
- Hastalar ve sağlık personeli için tarama amaçlı test istenmemelidir.
- Tüm sağlık personeli standart ve damlacık izolasyonu önlemleri almalıdır.
- Kalabalık ortamlarda hastaya cerrahi maske takması sağlanmalıdır.
- El hijyenine dikkat edilmelidir.
- Kişisel hijyen önlemlerine dikkat edilmelidir.
- Hasta ile bir metreden daha yakın mesafede temas edeceklerin cerrahi maske takmaları gerekir.
- Temashılara profilaksi yapılmasına gerek yoktur. Sadece temaslı kişi risk grubunda ve aşısız ise temas sonrası 48 saat içinde profilaksi başlanabilir (immunsupresif kişiler ayrıca değerlendirilmelidir).
- Gebelere vaka algoritmasına göre antiviral tedavi başlanmalıdır.
- Emzirenlere antiviral tedavi başlanabilir.